

四庫全書

子部

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷十四

心腹痛論

小兒心腹痛者由臟腑虛而寒冷之氣所干邪氣與臟氣相搏上下衝擊上則為心痛下則為腹痛上下俱作心腹皆痛更有一證發則腹中撮痛乾啼無淚腰曲背弓上唇乾額上有汗此名盤腸內吊之痛亦由冷氣入臟所為也今叙諸方于後

木香丸治心腹痛及脾胃

木香

一分

肉桂

一分

茯苓

去黑皮  
半兩

檳榔

半兩

當歸

去蘆一  
分醋浸

一宿炙

令黃焦

右為細末酒糊丸黍米大每服五七丸柳枝湯下不

拘時候

蓬莪散治氣刺心腹痛

右以蓬莪木炮熟透剉杵擣為細末每服一錢熱酒

調下無時

寬中湯治心腹疼痛不可忍斷乳啼哭不止

良薑

木香

各半兩

丁香

桔梗

去蘆

青皮

去穢炒黃

甘草

灸各一分

右為細末每服半錢溫酒調下無時

當歸木香丸治如前

當歸

去蘆一兩

蓬莪朮

一兩炮剉

木香

半兩

人參

去蘆半兩

桂心

半兩

不見火

黑牽牛

一錢炒微黃

右為細末麵糊和丸黍米大每服十九生薑湯下無

時

當歸丸治腸胃冷襲而痛啼哭不休

當歸

去蘆

芍藥

等分

右為細末麵糊和丸菴豆大米飲湯下不拘時候

乳香湯治如前

木香

五靈脂

去砂石

乳香

各一錢別研

天南星

取中心末一錢

右為細末同研勻每服半錢水半鍾生薑一片煎至

三分去滓溫服無時

温胃丸治腹痛哭不止

人參

去蘆  
一两

白朮

一两

木香

一两

良薑

半两

五味子

去枝梗  
半两

當歸

半两

右為細末麵糊和丸黍米大每服十九米飲湯下無

時

橘香湯治如前

青皮

去穰  
一两炒

吳茱萸

揀淨  
一两

木香

一两

當歸

去蘆  
一两

乾薑

丁香

半两  
一两

右為末每服一錢水八分生薑二片煎至五分去滓  
稍熱服無時

烏藥散治乳母冷熱不調敗壞乳汁因心飼兒致兒心  
腹疼痛或時下利但令乳母服藥調和乳汁哺兒

香附子

炒去毛

良薑

赤芍藥

烏藥

各等分

右為細末每用一大錢酒水各半盞煎至六分去滓  
溫服無時兒能服藥者兼與之

鯉魚腸治腸胃中有瘡而作疼痛

右以鯉魚腸煮食之

鈞藤膏治盤腸內吊腹痛

好乳香

研

沒藥

研

木香

薑黃

各四錢

木鱉子仁

二十箇

右為細末煉蜜為劑收之一歲兒半皂角子大煎鈞藤湯化下無時量大小加減次用魏香散

魏香散

右以溫水化阿魏一錢去沙石浸蓬莪朮半兩一晝夜取出焙乾為細末每服半錢煎米飲紫蘇湯調



下空心服

阿魏丸治盤腸吊痛日夜叫啼不止

右以阿魏為末用大蒜半瓣火炮熟研爛和末丸麻

子大每服五七丸煎艾湯送下無時

乳香蠟稍丸治盤腸內吊痛不可忍

乳香

一錢半  
別研

蠟稍

十四箇

沒藥

半錢

沉香

一錢半

右為細末煉蜜和丸黍米大嬰孩三九一歲兒五九  
三歲兒七九乳香湯下不拘時候

桃符丸治如前

銀硃

一錢  
研

乳香

一錢  
研

大蒜

一瓣煨熟  
研爛為膏

右上二味和勻入蒜膏再研硬軟得所九菴豆大每  
嬰孩三九半歲五九一歲七九二三歲七九薄荷湯  
下無時

腹脹論

小兒腹脹有虛有實或因吐瀉或因乳食動於脾胃致  
脾胃虛而氣攻所作也實者悶亂喘滿治可下之錢乙

用紫霜丸白餅子虛者不喘治不可下又不可以丁香  
木香橘皮豆蔻大溫藥治之以脾胃虛氣未出故雖腹  
脹而不喘只好用藥使上下分消其氣則愈錢乙用塌  
氣丸若悞下之則脾虛氣上附肺而行脾肺子母皆虛  
也肺主目胞腮之類脾主四肢色黃虛甚則目胞顛頰  
四肢黃色而腫錢乙用塌氣丸若虛氣已出附肺而行  
即脾胃內弱每生虛氣入於四肢面目矣小兒易為虛  
實脾虛則不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此

勿悞也胃久虛熱多生疸病或引飲不止脾虛不能勝  
腎隨肺氣上行於四肢面目腫若水狀腎氣浸浮於肺  
即大喘也錢乙亦用塌氣丸未愈漸加丸數病愈後面  
未紅者虛衰未復故也若治虛腹脹塌氣丸未愈腹中  
有食積法糞小便黃時微喘脉伏而實飲水能食者亦  
可下蓋脾初虛而後有積法也所治宜先補脾後與下  
之下後又復補脾即愈也若不先補而便下之則大虛  
矣又不可補肺恐生虛喘也錢乙所用方本集載之外

叙諸方于後

家寶塌氣丸治小兒啼哭未定或氣息未調遽以乳飲  
或寒冷相干腹脹氣急乳食不化

巴豆

十片胡椒

十粒丁香

十筒青皮

十筒湯浸一宿令軟去穢

右將青皮每箇入巴豆一片胡椒一粒丁香一箇裹  
了以麻線纏定都裹十箇畢頓鍋內入醞醋一碗煮  
至醋乾取出細切同諸藥焙乾為末粟米糊和丸粟  
米大每三歲下兒二三丸上者五丸五歲兒七丸七

歲兒十九米飲湯下無時

褊銀丸治痰涎氣壅鬲實上熱乳食停滯腹脹喘急

巴豆

去壳半兩取霜

好墨

八錢研

射香

半錢研

水銀

半兩用鉛二錢半結

沙子

右將巴豆霜與墨再研勻次入沙子麝香又拌研至細勻以陳米粥和丸菴豆大捻褊一歲兒一九二三歲三九煎薄荷湯放冷送下不得化破食後服

厚朴丸治風冷寒邪客於臟腑腹脹滿悶氣不宣通

厚朴

去麤皮一兩薑製

丁香

一兩

木香

一兩

白朮

一兩

青皮

去穰半兩

牽牛子

一錢炒

右為細末煉蜜和丸黍米大每服十九煎陳皮湯下

無時

分氣丸治腹脹腹痛

巴豆

十箇去壳皮膜出油盡

木香

一錢

附子

一箇重半兩炮去皮臍尖

右為細末麵糊和丸麻子大每服三二丸熟水送下

又方治腹脹

又名塌氣丸

蠟

半兩

胡椒

一兩

木香

半兩

巴豆

一分

去壳皮

膜出油盡

右為細末麪糊和丸黍米大每服三五丸葱白湯下

無時

胡粉鹽治腹脹

右以胡粉鹽炒色變以摩腹上或以車穀中脂和輪下土作丸吞之

韭根汁治如前

右杵韭根汁和猪脂煎服或燒父母指甲灰乳頭上



飲

半夏丸治腹脹及暴腹脹欲死

右以半夏隨多少火炮為細末酒和丸粟米大每服

三五丸兒小者乳汁下大者生薑湯或米湯下未差

加之日二服只用末貼臍亦佳

又方治心腹脇肋脹滿煩悶欲死

右以雞子殼燒末酒服一錢或半錢

塌氣丸治脾胃氣虛腹脹滿悶

全蠍

一錢 一半生用 熟

蘿蔔子

四錢 一半炒 熟 一半生用

陳皮

二錢 去白

青皮

二錢 去穢

京三稜

二錢 炮剉

蓬莪朮

二錢 炮剉 一方生用

右為細末麵糊和丸蘿蔔子大每服一二十九生薑

湯下無時

塌氣丸治腹脹氣滿如腫

胡椒

半兩

甘遂

一分

黑牽牛

一兩 炒

木香

一錢

右為細末糊丸菘豆大每服五七丸薑湯送下無時

塌氣丸治脾虛腹脹或面目四肢發腫

胡椒

一兩 蠍尾

半兩去毒 此方便  
是錢乙集中方也

右為細末麵糊和丸粟米大每服五七丸至一二十

丸陳米飲下無時量大小加減一方有木香一錢一

方全蠍一枚胡椒十粒同為末一剗耳米飲調下

五百丸治氣虛腹脹

郁李仁

別研

胡椒

丁香

黑牽牛

蘿蔔子

各一百粒

右為細末葱汁和丸菘豆大每服三五丸兒大加之

煎葱湯下無時

白朮膏治脾胃不和腹脹氣痞小便不利

白朮

半兩

白茯苓

去黑皮一分

人參

去蘆一分

滑石

一分

澤瀉

半兩

右為末煉蜜和膏每用皂子大米飲化下無時

豆蔻散治腹脹煩渴小便少而吐瀉

硫黃

一分

白滑石

三分

丁香

半分

肉豆蔻

麩裏煨半分

右為細末每服一字或半錢米飲調下無時

托養丸治陰陽氣痞不通腹脹膨悶嘔吐煩渴手足時

厥

硫黃

水銀

各半兩同  
研不見星

附子

炮去  
皮臍

木香

當歸

去  
蘆

燒焙各

半兩

大黃

一兩濕紙裹  
燬火煨熟

右為末拌勻煉蜜和丸櫻桃大每服一九生薑湯化

下無時

木香丸治小兒氣脹腹滿不下食能去惡氣

木香

訶梨勒

煨去核  
等分

右為末以沙糖水煮糊和丸菴豆大每服一二十九米

飲下無時

葛根汁治小兒熱氣痞滿腹脹

以生葛根杵爛絞汁飲下

桂心丸治小兒食雜果腹脹氣急

以桂心為末飯和丸棗豆大熱水下五丸未差再服  
不拘時候

治嬰小腹中脹滿

以父母指甲燒灰乳上服

治小嬰腹中脹滿或未能服藥者

以晚桑葉不以多少濃煎湯熏下部通手時淋洗肚腹

治小兒腹脹滿急不能服藥

以生薑煨熟綿裹內下部冷即易

賺氣丸治小兒腹脹

丁香

錢一

蘿蔔子

半兩用巴豆一分拍破同炒至黑色去巴豆不用

右為末水浸蒸餅心和丸菴豆大每服五丸橘皮湯

下無時

治小兒上熱痞悶氣壅脹滿

以葛根搗汁量大小輕重與服

腫病論

小兒腫病有二一者氣腫因脾胃虛而氣攻腹腹脹誤行轉藥下之致虛氣上附於肺行入四肢面目而作腫也瘡氣亦然二者水腫因上焦煩渴飲水無度脾胃虛而不能約制其水腎反乘脾土隨水行上附於肺脾主皮膚脾主四肢故水流走於四肢皮膚而作腫也甚則



腎水浸浮於肺則生大喘為難治也

欵肺散治小兒風痰欬喘氣逆嘔吐面目浮腫

白姜蠶

五兩湯洗去灰  
系并頭足焙乾

玄胡索

去皮三  
兩生

右為細末每服一字或半錢煎淡薑汁放溫調下如  
嬰孩乳汁調半字不拘時候

熊膽丸治小兒疳氣體瘦肚腫喫水

熊膽

雄黃

研水  
飛

佛頭青

各半兩入射香  
少許同研細

桂心

人參

去蘆各一  
錢為末

右拌研勻糯米粥和丸菘豆大每服五七丸米飲下  
食後

檳榔丸治小兒疳氣腹脹四肢腫滿氣急喘悶小便不利

檳榔

木香

各二錢

青皮

薑黃

各一兩

蘿蔔子

炒

牽牛子

各取末七錢半

右為末糊丸黍米大生薑湯下二三十九食後

緋綬丸治小兒疳氣黃瘦肚大手脚浮腫飲水不休

川棟子

去核

芎

各一錢

橘皮

四兩去穰

龍膽

去蘆二兩

巴豆

十四箇去

皮膜將陳皮能胆同巴豆炒焦黑時去巴豆不用

右四味為末糊丸麻子大朱砂末為衣每服十五丸  
或二十九丸米飲下腹脹陳皮湯下食後

治小兒手足身體浮腫

以小便溫煖漬之大良

又方治如前

以巴豆五十箇去皮心水三升煮取一升綿蘸拭病

上隨手即消

治小兒渾身頭面及陰囊虛腫

以使君子一两去殼用蜜半兩炙盡為細末每服一錢米飲調下食後只三服效

內消丸治小兒頭面手脚虛腫

青皮

五箇湯泡去穢

巴豆

七箇去壳

木香

一錢炮

防已

一錢半

丁香

十四箇

右先以青皮巴豆鉋內同炒至巴豆蒼黑去巴豆不

用將青皮諸藥為細末蒸餅和丸麻子大每服三五  
丸量大小加減男孩兒煎陳米湯下女孩兒煎艾葉  
湯下七八歲者十九不拘時候

紅粉散治渾身虛腫氣喘不食

硃砂

錢一

檳榔

錢一

輕粉

錢半

右為末每服一字或半錢薄荷湯調下一服利止後  
服用家寶觀音散或人參散調補忌生冷堅硬之物  
通草散治一身黃腫透明

通草

蜜塗灸  
乾為末

木猪苓

去黑皮為  
末各等分

右為細末再入研細去土地龍麝香少許每服半錢  
或一錢米飲調下神效亦治腎腫

聖餅子治氣腫

大戟子

半兩

甘遂末

一分

牽牛末

一分

右拌勻每用半錢以白麵半錢水和作餅子如錢大  
煮令熟放冷細嚼薑湯下小者一餅大者三餅食前  
金華散治水氣腫滿通身明亮

大黃末

錢四

牽牛末

錢四

朴硝

研末

巴豆肉

五箇

研

右同拌勻每服一字生薑蜜水調下此方猛烈斟量

所宜

葶藶丸治水氣腹腫小便澀滯

右以葶藶子半兩微炒杵如泥入棗肉再杵和丸棗  
豆大每服五丸棗湯下空心晚後

郁李仁丹治一切諸腫

郁李仁

半兩湯浸  
去皮微炒

檳榔

半兩

牽牛子

一錢  
炒

右為細末滴水和丸每服十粒煎葱白湯下空心服  
海蛤散治身體腫滿大小便不利

海蛤

桑白皮

各一兩

漢防已

半兩

赤茯苓

去黑皮半兩

白朮

半兩

甜葶藶

紙襯炒紫

川朴硝

木猪苓

去黑皮各一分

右為細末每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服乳  
後食

杏仁膏治小兒卒然面目浮腫

以杏仁杵膏傅之



治小兒渾身虛腫及頭面陰囊並腫

木香

一錢

檳榔

一枚剉以茱萸炒去茱萸

青皮

一錢以巴豆七箇去皮炒去巴豆

右同為末每服半錢或一錢陳米飯調下食前

治小兒因瀉痢後身體虛腫

硫黃

一兩

三錢

右同研細蒸餅和丸蘿蔔子大蜂粉為衣每服十九  
米飲下量兒加減食前

虛羸論

小兒虛羸者由諸病之後或誤行轉藥或吐而利致脾胃虛弱不能傳化穀氣飲食不入肌膚消瘦乃成虛羸也有冷者時時下痢唇口青白有熱者身體溫壯肌肉微黃此冷熱虛羸也錢乙治冷者木香丸夏月不可服如有症則少服之治熱者胡黃連丸冬月不可服如有症則少服昔錢乙治齊郎其人好收藥散施有子忽患臟熱齊自取青金膏三服併一服餌之服畢至三更瀉五行其子困睡齊言子睡多生驚又與一服再瀉兩行

加口乾而身熱齊言尚有其熱又欲與青金膏其妻曰  
用藥瀉十來行未安莫生病痞召乙看之乙曰已成虛  
羸也先多煎白朮散時時與服後用香瓜丸十日愈乙  
又治朱監簿子五歲發熱腮赤唇紅煩躁引飲前鑿曰  
此心熱也遂用牛黃圓及以一物瀉心湯下之來日加  
無力而不能食又下之乃便利黃沫召乙看之乙曰此  
心經虛而有留熱在內必被涼藥下之致此虛羸也乙  
先用白朮散生胃中津液以生犀散治之朱曰大便秘黃

沫何如乙曰胃氣正即瀉自止此虛熱也朱曰鑿用瀉  
心湯何如乙曰瀉心湯黃連一物耳性寒多服則利能  
寒脾胃也坐久前鑿至曰實熱乙曰虛熱若實熱何以  
瀉心湯下之不愈又加面黃頰赤五心煩熱不食而引  
飲前鑿曰既虛熱何大便黃沫乙笑曰便黃沫者服瀉  
心湯多故也乙復與胡黃連丸愈乙又治一子夜發熱  
曉即如故前鑿作熱治以涼藥解之不愈其候多涎而  
喜睡鑿又以鉄粉丸下之其病益甚至五日大引飲唇

白不食召乙看之乙曰此肺怯有熱不可下之若下之則損脾胃致虛羸也乃用白朮散更以朮一兩煎藥汁三升使任意取足服朱曰飲多不作瀉否乙曰無生水不作瀉縱瀉亦不作恠也但不可下耳朱曰先治何病乙曰止瀉止涎退熱清神皆此藥也至晚服盡乙看曰更可服之又作三升服盡稍愈第三日又作三升與服其子不渴無涎遂投阿膠散二服而安已上三證皆因誤行轉下之藥亡耗津液致胃虛發渴不食而成虛羸

錢乙並先煎白朮散與服以生胃中津液得胃氣正然後依本病為治也如齊郎中子臟熱與香瓜丸朱監薄子心虛熱與生犀散胡黃連丸次子肺怯與阿膠散並皆安愈故閔忠孝云轉下過多洩瀉等諸病煩渴者皆津液內耗也不問陰陽煎錢乙白朮散使滿意取足飲之彌多彌好今特為詳而論之使學者法矣錢乙所用方本集載之外治虛羸諸方具于後

丁香黃耆散治脾胃虛弱不能食漸致肌瘦虛羸

丁香

綿黃耆

剉

人參

去蘆

白朮

當歸

去蘆

鱖魚甲

酥

炙焦去裙

爛各一兩

胡黃連

甘草

炙各半兩

右為細末每服一錢水一小盞生薑二片棗一箇煎

至五分去粗溫服食前

集香煎治如前

丁香

沉香

木香

藿香

去土

厚朴

去麤皮姜

製各一兩

白朮

白茯苓

白豆蔻

各半兩

右為細末入研細麝香一錢拌勻以水一升蜜半觔

大棗三十枚生薑二十片於銀器中燉火熬成膏去  
薑棗不用攪勻頓當風處蔭乾每用皂角子大米飲  
化下乳食前

國老丸治瘦瘠虛羸愒愒少氣

右以甘草炙焦黃杵末煉蜜和丸菘豆大每服五丸  
溫水下日三服一歲兒五丸已上者七八丸以意加  
減無時

欬嗽論



夫欬嗽者內經以為肺感微寒而所作也若七八月之間肺氣旺盛之時病嗽者其病必實非久病也其症面赤痰盛而身熱治當下之錢乙用葶藶丸若病久者不可下若十一月十二月嗽者乃傷風寒嗽也風寒從背第三椎肺俞穴入其症頓悶惡風憎寒晝輕夜甚治當汗之錢乙用麻黃湯若有熱症則面赤飲水涎壅咽喉不利錢乙兼用甘桔湯若嗽於五七日間其病身熱痰盛唾粘或痰盛不甚喘面赤或時飲水錢乙並以褊銀

丸下之若肺盛嗽而後喘身熱悶亂面腫或飲水不飲水者錢乙用瀉白散昔錢乙治張氏孫兒九歲病肺熱欬嗽前醫以珠犀龍麝牛黃藥治之一月不愈其症欬喘喘急悶亂飲水不止全不能食召乙治之乙用使君子丸益黃散張曰本有熱何又行溫藥他醫用涼藥攻之一月尚無効乙曰涼藥久則胃寒不能食小兒虛不能食當與補脾候飲食如故即瀉肺經病必愈矣服補脾藥二日其子欲飲食以瀉白散瀉肺遂愈張曰何以不

虛乙曰先實其脾然後瀉肺故不虛也

又傷風寒欬嗽無熱症而但嗽者錢乙用麻黃湯及化痰藥治之若肺虛而嗽有哽氣時時長出喉中有聲者此久病當補也錢乙用阿膠散昔錢乙治杜氏子五歲自十一月病嗽至三月未止始得嗽而吐痰乃風寒入肺也風在肺中故嗽而吐痰宜以麻黃湯發散後用涼藥壓之即愈他醫却以諸藥下之其肺即虛而嗽甚至春三月間尚未愈乃召錢氏看之其候面青而光嗽而

喘促哽氣又時長出氣錢曰病困十已八九矣所以然者面青而光乃肝氣旺也春三月者肝之位肺衰之時也嗽者肺之病自十一月至三月久即肺虛痿又曾下之脾肺子母俱虛復為肝所勝此為逆也故嗽而喘促哽氣長出氣也乙急與瀉青丸瀉肝後與阿膠散實肺次日面青而不光乙又與補肺其嗽如前又與瀉肝未已而又加肺虛唇白如練乙曰此病必死不可治也何者肝大旺而肺虛絕肺病不得時而肝勝之今三瀉

其肝而肝病症不退三補其肺而肺病尤虛此不久生  
故言死也此症病於秋者十救三四病於春夏者十難  
救一果大喘而死

又肺氣不足謂寒邪所干欬嗽喘滿短氣者治補肺昔  
錢乙治李轉運孫八歲病嗽而喘滿短氣他醫以為肺  
經有熱用竹葉湯牛黃膏治之三日加喘召乙治之乙  
曰此肺氣不足復有寒邪即便喘滿當補肺脾勿服涼  
藥李曰已服竹葉湯牛黃膏乙曰何治也前鑿至曰退

熱退涎乙曰何熱所作鑿曰肺經熱而生嗽嗽久不除  
生涎乙曰本虛而風寒所作何熱也若作肺熱何不治  
肺而反調心也竹葉湯牛黃膏皆治心藥也鑿有慚色  
乙依所論而治愈

又欬嗽咯膿血者肺熱也錢乙用甘桔湯若嗽而吐痰  
涎喘者先實其脾錢乙用益黃散後微下之錢乙用褊  
銀丸涎退即補肺乙用阿膠散昔乙治段齋郎子四歲  
病嗽身熱吐痰數日咯血前鑿以桔梗湯防已丸治之

不愈涎上攻吐喘不止請乙治之乙下礪銀丸一大服復以補脾藥治之或問此子咯血肺虛何以下之乙曰肺雖咯血有熱故也久則虛痿今涎上潮而吐當下其涎若使不吐涎為甚便蓋吐涎能虛又生驚也痰實上攻亦使發搐故依法只宜先下其痰為順此治先下後補與前論先補後下其意相反者經以謂病有緩急治有先後也治病症如錢乙所以得聖人之旨趣學者宜為法耳嗽而吐青白綠水者此胃冷有停飲也乙用百

祥丸下之嗽而吐痰涎乳食者此有傷宿滯不化也乙  
用白餅子下之

若久嗽肺虛亡津液者乙用阿膠散補之治嗽大法盛  
則下之久則補之風則散之更量大小虛實意以施治  
是以慎護小兒須常著夾背心雖夏月熱時於單背心  
上當背更添襯一重蓋肺俞在背上恐風寒傷而為嗽  
嗽久不止亦令生驚若百晬內兒病嗽者十中一二得  
全亦非小疾也



又有停飲作痰者由兒乳飲失宜致脾胃不和停滯其  
飲不散留結成痰若隨氣上干於肺而嗽者此為痰嗽  
若不嗽者則肺壅不利咽塞唾涎胸腹隔滯

又脾胃冷熱不調涎不歸胃致涎流口角而無休止冷  
者鼻上色青及大便青白熱者鼻上赤色及大便赤黃  
已上除錢乙所用方本集載之外今叙諸方于後

金黃散治嬰小欬嗽

欬金

半兩

防風

去蘆及叉

枝一分

半夏

一分

巴豆

二十粒

皂角

一錢

以水一升於銀器用煮諸藥至水乾去巴豆皂角不用外三味別用溫湯洗淨焙乾為細末每嬰孩一字二三歲半錢四五歲上者一錢薄荷蜜水調下不拘時候

藿香散治不因風寒所得肺胃氣不和而欬嗽

藿香

去土二十箇葉

枳殼

二片去穢濕紙裏煨令熟

蚌粉

枳殼大一塊

右為細末嬰小服一字二三歲半錢蜜水調下不過二三服安兒大以意加之無時

紫金丸治諸欬嗽墜化痰涎

右以葉子雌黃不拘多少研細入鍋子內微火中燒  
令成汁候冷取出再研細軟飲和丸蘿蔔子大熟水  
下丸二箇臨睡

杏仁煎治小兒欬嗽上氣

右以去皮尖炒黃杏仁一升熟搗用蜜三合先入一  
合搗令強次入一合搗如膏又入一合搗熟每食後  
用少許頓兒口中含化咽之日三次無時

生薑煎治幼小欬嗽

生薑

一兩

乾薑

六錢

桂心

一分

甘草

四錢

杏仁

去皮稍炒  
黃一兩

款冬花

去枝  
梗

紫苑

各四  
錢

右為末以蜜一兩入藥在內微火上煎之如飴量大

小多少與含化嚥百日兒如棗核大日三甚效

款冬花丸治小兒欬嗽日差夜甚初不得息不能復啼

款冬花

紫苑

各一  
兩半

桂心

半  
兩

伏龍肝

一  
分

右同為細末煉蜜和如泥每取棗核大傅乳上令兒

欽定四庫全書



小兒衛生總微論方  
卷十四

吮之漸漸令兒飲一日三次

麥門冬湯治初生兒十日上至五十日卒得聲欬吐乳

嘔逆暴嗽晝夜不息

麥門冬

去心  
一兩

紫苑

去蘆  
三分

甘草

二錢  
半

桂枝

半兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分以綿蘸滴兒口

中晝夜四五過仍節乳哺

五味子湯治小兒風冷入肺咳嗽氣逆面青喘迫晝夜

不息飲食不下

五味子

去枝梗

當歸

去蘆各半兩

麻黃

去節

乾薑

炮

桂心

人參

去蘆

紫苑

甘草

各一分

細辛

去苗半分

大棗

三枚

右為麤末每服二錢水一盞煎至半盞去滓溫服量

兒大小

人參半夏湯治小兒痰逆咳嗽不止

人參

去蘆

半夏麴

白芷

各半兩

藿香葉

去土一分

丁香

杏仁霜

各半分

右為細末每服二錢水一鍾生薑五片陳粟米五十

粒煎至七分去滓時時呷服日三四忌醋鹹炙煨生  
冷

欬肺散治小兒風壅痰盛欬嗽氣急壯熱頰赤昏憤嘔  
吐面目浮腫乳食減少

白殭蠶

五兩淨洗去  
系頭足焙乾

玄胡索

去皮  
三兩

右為末每服一字或半錢淡薑汁溫調服之無時嬰  
孩只乳汁調半字

治小兒咳嗽聲不出

杏仁

一兩湯浸去皮尖及雙仁者以水一鍾一絞取汁

紫苑

去蘆半兩洗去土為末

右將紫苑末入杏仁汁中更入蜜一合同煎成膏每服半茶匙清粥飲調下無時

皂莢豉湯治小兒咳嗽

右以皂莢燒灰研細末每服半錢或一錢豉湯調下無時

露蜂房散治如前

右以露蜂二兩淨洗去蜂糞塵土以快火燒為灰研



末每服一字米飲下無時

葶藶散治如前

甜葶藶

半兩炒

麻黃

去根節一分

甘草

一分炙

貝母

去心炒一分

杏仁

去皮尖一分炒黃研

右為細末每服半錢水半盞煎至三分去粗溫服無

時

訶子膏治如前

右以訶子一两每箇分作两片甘草一分水一大盞

煮至水盡為度焙乾為末煉蜜和膏雞頭子大每用  
一大豆許薄荷熟水化下無時

生薑浴湯治如前

右以生薑四兩煎湯沐浴

一捻金散治風痰欬嗽頰赤痰盛喘促氣急吐嘔浮腫

乳食減少

白殭蠶

直者去系  
嘴一兩

甘草

半兩

玄胡索

去皮  
一分

右為細末每服一捻薑汁調下嬰孩只乳汁調下半



字食後

惺惺散治傷寒風熱痰壅咳嗽

桔梗

去蘆

細辛

去葉

人參

去蘆

甘草

剉炒

白茯苓

去皮

白朮

瓜蒌根

各半兩

右為細末每服二錢水一盞薄荷五葉煎至半盞溫服如要和氣更入生薑三片同煎一方更有防風一分

保肺丸治肺胃受風熱痰盛欬喘吐連聲不止及治

久嗽不愈

白殭蠶

去系嘴  
炒二兩

山藥

半兩

白茯苓

去皮  
一兩

紫蘇葉

一兩

藿香

去土  
一兩

百部

半兩

黃芩

一兩

防風

去蘆  
一兩

杏仁

去皮尖麩  
炒一兩

百合

半兩

五味子

去枝梗  
一兩

右為細末煉蜜和丸雞頭大每服半九一九煎桔梗

湯化下食後臨卧服

貝母湯治肺感風邪咳嗽喘滿

貝母

去心一兩

半夏

一兩白礬湯  
洗七次焙乾

乾薑

半兩  
炮

麻黃

去根節  
半兩

款冬花

去枝梗  
半兩

甘草

炙  
半兩

右為細末每服一錢水一小盞生薑三片杏仁三箇

去皮尖同煎五分去粗溫服不拘時

菖蒲煎治肺中風邪肩息喘鳴或發咳嗽

石菖蒲

一兩一寸  
九節者良

款冬花

去枝梗  
一兩

紫苑

去土淨洗  
培乾一兩

人參

去蘆  
一兩

桂心

一兩

右為細末煉蜜和劑入石臼中杵一二百下丸皂子

大每服一粒煎糯米飲化下食後臨臥服

絳朱丹治驚風涎痰咳嗽喘滿

天南星

二兩  
炮

半夏

二兩湯洗  
七次去滑

枯白礬

一兩  
半

滑石

二兩

火煨  
通赤

鉛白霜

一分

右為細末麩糊和丸麻子大硃砂為衣每服十粒薑湯送下食後臨卧服

人參犀角散治時氣寒壅咳嗽痰逆喘滿驚悸風熱

前胡

去蘆  
八錢

桔梗

五錢

人參

去蘆  
三錢

甘草

三錢  
炙黃

杏仁

浸去皮尖唾  
乾為末五錢

右先將上四味為末入杏仁末拌勻麤羅篩過每服  
二錢水一盞煎至七分去粗溫服食後亦能調和五  
臟六腑進美乳食又治一切風熱服尋常涼藥即瀉  
減食者尤宜與服

油滾丸治痰盛咳嗽亦治乳嗽

五靈脂

末一錢

雷丸

末一錢

巴豆

三十箇去皮膜取霜

右為細末滴水丸芥子大每服三五丸油滾井水送  
下臨卧而服

龍瓜散治涎喘咳嗽

右以豬蹄甲四十九箇洗淨控乾每箇豬甲內入半  
夏白礬末各一字入一罐子內封閉不透烟火煨通  
赤放冷為細末入研細麝香一錢拌勻每服半錢糯  
米飲調下空腹

辰砂半夏丸治寒痰咳嗽

瓜蒌根

蜜炙

天南星

湯洗

半夏

湯洗七次

乾薑

炮各半兩

右為末生薑自然汁和丸麻子大硃砂為衣每服十



丸生薑湯下不拘時候

玉珠丸治諸涎嗽

半夏

一兩湯洗七次

硝石

一分

右為細末滴水丸麻子大每服三五丸生薑湯送下

不拘時候

百部丸治肺寒咳嗽微喘

百部

焙乾秤三分

麻黃

去根節秤三分  
二味先為末

杏仁

四十箇去皮  
夫微炒更煮

三五沸焙

乾研細

右同勻細末煉蜜和丸皂子大溫水化下二三九日

三服錢乙加松子仁五箇糖和丸含化大妙

露蜂房九治肺胃虛寒咳嗽喘滿嘔逆不食

露蜂房

二錢炒

蟬殼

去土二錢炒

蛤蚧

一隻重四錢塗酥炙乾

丁香

木香

人參

去蘆

地黃

麻黃

去節根

馬兜鈴子

五倍子

去虫各二錢

五味子

去枝梗

貝母

去心焙

杏仁

童子小便浸二

宿去皮尖炒

半夏麴

各二錢半

款冬花

去枝梗半兩

右為細末煉蜜和丸菴豆大每服二三十丸生薑湯

下日三四服食後

緩息湯治風傷肺氣虛喘咳嗽上氣

桑白皮

一兩半

白茯苓

半兩

白殭蠶

半兩去  
系炒

甘草

一分  
炙

杏仁

半兩去皮  
尖研後入

人參

去蘆  
一分

桔梗

去蘆  
半兩

白朮

半兩

陳皮

半兩  
去白

右為細末每服一錢水一盞生薑三片杏仁二箇煎

至六分去滓時時溫服

白朮五味湯治氣逆上喘咳嗽

白朮

五味子

去枝梗炒

人參

去蘆

款冬花

去枝梗各半兩

細辛

去上葉一分

右為細末每服一錢生薑三片煎至四分去滓放溫

時時服

桔梗湯治咳嗽痰壅呀咽不利

桔梗

去蘆半兩

甘草

半兩炙

紫蘇葉

半兩去土微炙

石膏

半兩

半夏

半兩湯泡七次

皂莢

一分燒灰存性

右為末每服一錢水一盞生薑三片煎至五分去滓

放溫時時服無時

淡竹瀝治咳嗽短氣膏中吸吸咯唾稠濃臭粘

唾音睡

右以淡竹瀝一合服之日三四次

木香半夏丸治肺胃有寒咳嗽

木香 半夏

湯泡七次焙乾

肉豆蔻

麪裹煨各一兩

藿香

去土

丁香 白朮

各半兩

右為細末生薑自然汁和丸黍米大每服十九煎人

參湯送下不拘時候

白蜆殼散治卒然暴嗽不止

右以白蜆殼不拘多少杵研極細每服半錢米飲調

下無時

五靈脂丸治久嗽漸成羸弱恐變疔勞

五靈脂

去沙土  
半兩

蟾頭

一枚酥  
炙黃

蟬殼

去土半  
兩微炒

款冬花

去枝梗  
半兩

青黛

一分  
研

雄黃

一分  
水飛

右同研勻細糯米飯和丸黍米大每服十九煎人參

湯下食後

人參半夏丸治痰飲咳嗽

人參

去蘆

半夏

湯泡七次

白朮

川薑

炮

南星

微炒

各半兩

右為細末生薑自然汁煮糊和丸黍米大每服十九  
薑湯下月內百晬兒丸針頭大乳上吮服不拘時候

馬兜鈴治肺壅咳嗽氣喘大便不利

馬兜鈴

紫蘇子

炒

人參

去蘆

各一兩

木香

款冬花

去枝梗

杏仁

湯浸去皮尖

各半兩

研後八一分

右上五味先為末入杏仁末拌勻研煉蜜和丸黍米

大每服十九生薑湯下不拘時候

百合丸治肺經風寒痰壅不利

百合

紫苑

洗焙

白朮

人參

去蘆各一兩

白茯苓

去黑皮

青皮

去核

甘草

麥門冬

去心各半兩

右為末每服一錢水八分淡竹葉三片薄荷二葉煎至五分去滓溫服不拘時候

爽神湯消寒痰除肺壅清神爽意

白朮

人參

去蘆

白茯苓

各一兩

桔梗

去蘆

瓜蒌



甘草

各半  
兩

細辛

去苗  
一錢

右為末每服一錢水八分荆芥薄荷各少許煎至五

分去滓溫服不拘時候

蘇香湯治肺壅消痰滯

紫蘇葉

去土

木香

人參

去蘆各  
半兩

五味子

去枝  
梗

甘草

陳皮

各半  
兩

右為細末每服半錢生薑自然汁少許荆芥湯調下

不拘時候

蟬殼湯治肺氣壅滯不利

蟬殼

去土  
微炒

人參

去  
蘆

五味子

去枝梗  
各一兩

陳皮

甘草

炙各  
半兩

右為細末每服半錢生薑湯調下無時

神麴湯治痰涎壅滯氣不和順腹脇滿悶

神麴

一兩  
微炒

木香

一兩

半夏

一兩用薑半觔同拌爛  
炒令黃薑是生薑也

蕪荑

一兩  
炒

青皮

去糠半  
兩炒

甘草

半兩  
炙

白茯苓

半兩

右為細末每服半錢鹽少許沸湯調溫服無時

白金丹消肺壅痰實治胸膈不利

桑白皮

一两 剉

前胡

去蘆 一两

半夏

一两 湯泡七次

白朮

一两

人參

去蘆 半兩

陳皮

半兩

甘遂

一分 微炒

右為細末煉蜜和丸黍米大溫水下五七丸周晬至

一二歲兒三九已上者以意量加不拘時候

前胡半夏丸治風熱痰實肺氣壅滯涎流口出

前胡

去蘆 一两

半夏

一两 湯泡七次 焙乾

大黃

半兩 炮

麥門冬

去心 半兩

川朴硝

半兩

右為細末生薑自然汁和丸黍米大每服十九煎人

參湯下不拘時候

犀角丸治風熱面赤胃氣不和大小便秘瀝痰實涎盛

三焦壅滯及積熱蘊毒

滌音澁

生犀末

一分人參

去蘆半兩

黃連

去鬚一兩

枳實

去穰炒半兩

檳榔

半兩

大黃

二兩酒浸一宿切作片子以巴豆一百粒去殼皮貼大黃上紙裹定飯上

蒸三次去巴豆切研炒焦

右為細末煉蜜和丸麻子大每服五七丸臨卧熱水

下未動加丸數服此踈利極穩之藥

治小兒痰壅肚熱諸病

以雞子亂髮熬良久得汁與服之良

枳殼湯治痰實肚熱心膈煩悶氣不調順不早治恐生

驚癇

枳殼

一兩去  
穢麩炒

乾薑

半兩  
炮

甘草

半兩

前胡

去蘆  
一兩

木香

一兩

半夏

一兩湯  
洗七次

右為末每服一錢水一小盞生薑三片陳皮一片煎

至六分去滓溫服不拘時候

温脾丸治脾胃宿冷口角涎流

若涎漬頤頰口角生瘡名曰滯頤別立于后

丁香

一两

木香

一两

半夏

一两用生薑六兩同杵爛炒令黄

青皮

去穰半两炒

白朮

半两

乾薑

半两微炒

右為末煉蜜和丸黍米大每服十九丸米飲下不拘時

候

丁香湯治如前

丁香

一两

白朮

半两

肉豆蔻

半两裹煨

半夏

半两白礬水浸一宿洗淨

炒 乾薑

半两炮

甘草

半两

人參

去蘆半两

右為細末每服一錢水八分薑二片煎至五分去滓  
溫服不拘時候

治小兒口中涎出

以白羊屎內口中

麻黃湯治小兒風中肺經喘急肩息氣上不安

麻黃

去根節  
二兩

半夏

生薑

各二兩  
製麴

甘草

一兩  
桂心  
兩半

五味子

去枝梗  
半升

右㕮咀每服二錢水一盞煎六分去滓服無時

馬通粟粒丸治小兒喘急肩息氣逆脇下作痛寒熱往來不能乳食漸成羸瘦

馬通中粟粒

三分

杏仁

湯浸去皮尖

紫苑

去蘆

細辛

去苗各半兩

石膏

秦朮

去蘆

半夏

湯泡七次

茯苓


去皮

五味子

去枝梗各一分

右為末煉蜜丸小豆大每服十九生薑湯下日三服加至十二丸不拘時候





小兒衛生總微論方卷十四

欽定四庫全書

子部

小兒衛生總微論方卷十五

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣姜士安

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷十五

黃疸論

小兒有身體肌膚面目悉黃者此黃病也因將息過度飲食傷飽脾胃受熱與穀氣相搏蒸發於外脾胃象土其色黃候肌肉故為是病也慎不可灸灸則熱轉甚矣若身體痛背膊強大小便溢腹脹滿一身盡黃及目睛爪甲皆黃小便如屋塵色著物皆黃此疸病也若發渴

小便澀腹滿脉沉細為難治也黃病者稍輕疸病者極重又有自生下面身深黃者此胎疸也因母臟氣有熱熏蒸於胎故也經言諸疸皆熱色深黃者是也若身微黃者胃熱也若但面黃腹大渴而食泥土者脾疸也此二項各在本病具之外黃病疸病叙方於後

三黃散治黃病

川大黃

一兩剉碎微炒

黃芩

半兩黃連

去鬚半兩

右為細末每服一錢水一盞煎至五分去滓放溫食

後時時服

子苓散治如前

黃芩

瓜蒌根

茯神

去心內木  
各一兩

甘草

炙

胡黃連

各半  
兩

右為細末每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服不

拘時候

莖根汁治如前

右杵莖根取汁滴兒鼻中大豆許

丁香散治黃病遍身如金色

右六月六日收瓜蒂四十九箇丁香四十九箇入乾鍋子內火燒烟盡取出放冷研細末每用半字吹鼻中及揩牙

蔓菁子汁治如前

右以蔓菁子汁水和服之半錢或一錢亦治痘病

豬苓通草散治黃病透明黃腫

水豬苓

去黑皮

通草

塗蜜炙乾各等分

右為細末更入研細麝香去土地龍末各少許拌勻  
每服半錢或一錢米飲調下不拘時候神效

括萋根汁治小兒忽發黃面目皮膚悉黃

右以生括萋根杵取汁三合蜜一大匙煖鎔相和量  
兒大小服之不拘時候

雙連丸治諸疸病

川黃連

去鬚  
一兩

胡黃連

一兩

右為細末用黃瓜一枚切蒂頭留作蓋子去穰入藥

末在瓜中却以蓋子蓋定用麵裹慢火煨令麵熟焦  
去麵杵爛成劑丸棗豆大每服五七九至十九溫米  
飲下量大小加減不拘時候

茅煎湯治黃疸病

柴胡

去苗淨洗  
焙乾一兩

甘草

一分

右咬咀每服二錢水一盞白茅根少許同煎至五分  
去滓溫服無時

螺肉酒治如前



右取田螺肉一二十箇作刮剝酒服之

驢乳汁治嬰小熱黃胎疸

右取驢乳汁少少與服

客忤論

小兒中客忤者小兒神氣嫩弱忽有非常之物或未經  
識見之人偶然觸而見之其客氣與兒神氣相忤以生  
病謂之客忤其候吐下青黃白色水穀解離腹痛夭矯  
面色變易五色不常狀似驚癇但目不上視其脉弦急

數者是也若不即治久則難療聖濟經曰出處不時而為客忤戒其恐見非常人物為病也千金曰小兒衣帛綿絮及鞋襪中皆不得令有頭髮又青衣不可用白帶白衣不可用青帶或諸識人物外來者並當令兒避之勿見若誤有觸犯並令兒患客忤或有犯而患者急視其兒口中懸癰左右有腫核如麻豆大者便須刺摘令潰之用綿纏釵積頭展去其血兼服諸藥為治

治小兒客忤腹痛天矯面色變易

以香豉數合水拌令濕搗熟丸作丸子如鷄子大用  
摩兒顙上及手足心各七遍及摩兒心臍上下行轉  
摩之食頃破其丸視其中當有細毛即擲弃丸於道  
中痛乃便止

治小兒卒中客忤塗法

竈中黃土

蚯蚓糞

等分

右研細水調塗兒頭上及五心中大良

又方浴法治如前

以馬糞三升燒令烟絕用酒三升煮數沸去滓將以  
浴兒

以豕豬糞二升熱湯灌攪適溫煖浴兒

又方治小兒客忤服法

以牛口沫塗乳上飼兒

以銅鏡鼻燒令赤內酒中能飲者令自飲不能飲者  
含而灌之

治小兒中客忤吐青白沫及乳食皆出腹中痛氣欲絕

者

以桂心一兩為末一二百日兒以半錢用水一小盞煎至五分去滓溫分四服不拘時候量兒大小加減

又方治小兒客忤

右以白殭蠶七枚為末酒調服半錢至一錢

又方治如前

右取書中白魚十枚傅乳頭令兒吮服

今人呼為衣魚

又方治如前

右取驢乳汁少少與服或以熟馬屎一塊絞汁飲嚙  
下即愈

麝香乳治客忤項強欲死

右以麝香少許研細用乳汁調抹兒口中如大豆許  
良

又方治如前

右以桔梗燒末半錢調服量大小加減

治馬毒客忤

右以馬尾於兒面前燒令兒嚙烟氣每日用之取差  
治客忤夜啼穰法

右用本家厨下燒殘火柴頭一箇以焦頭為上朱書  
云吾是天上五雷公將來作神將能收夜啼鬼一縛  
永不放急急如令書了勿令兒知立在兒床下倚前  
脚裏廂立之男左女右

辟邪膏治客忤及治中惡邪厲鬼氣其候似癇但目不  
視上倒視脉弦急中之卒暴者立至蘇省

降真香

剉

白膠香

研

沉香

虎頭骨

酥炙

鬼白

去毛

草龍膽

去蘆

人參

去蘆

白茯苓

去心

肉桂

各半兩

右為細末次入研飛過雄黃末半兩研細麝香一錢  
拌勻煉蜜和丸鷄頭子大每服一粒煎乳香湯化下  
及丸一彈子大用綠絹袋盛之帶兒衣上仍於卧處

常燒炒

三症論

小兒疰病有三一者鬼疰小兒神氣弱早晚抱持出



入無時為鬼厲邪氣所干其候皮膚掣痛游易無常或  
心腹刺痛天矯悶亂欲死迺名中惡甚者卒致於死緩  
者延引歲月更變沉滯以致於死又注傍人二者尸疰  
人腹中有虫曰尸疰小兒血氣嫩弱邪氣外傷留滯身  
中尸虫移引相乘為病其候沉沉嘿嘿不知的病之處  
或寒或熱或心腹悶痛涉引歲月遂至於死又注傍人  
三曰蠱毒疰謂諸毒虫之中有一能噉其餘者即為之  
最名之曰蠱或因人作或因引注隨飲食入而兒腹中

食人臟腑其候心腹刺痛燥悶欲絕利下無時或便血片急者即死名曰中蠱之毒緩者涉引歲月以至臟爛乃死又注傍人今叙諸治方于後

虎頭枕治中鬼氣為遊氣為魔

右以虎頭骨為枕與兒枕之

千金湯治小兒暴驚啼絕死因人從外來邪氣所逐令兒得疾衆醫不治

右以蜀椒左顧牡蠣各六銖碎之酢漿一升煮取五

合分服

豆豉丸治中惡鬼氣寒熱

右以溫豉丸鷄子大摩兒腮上及手足心六七遍又  
摩心腹臍上旋旋以言祝之了即破其豉丸看之當  
有細毛弃道中

又方治中惡邪鬼氣或於病間忽然而卒絕

右以生菖蒲根杵爛取汁灌之

又方治如前

右以羊屎燒烟以熏鼻中

又方治如前

右視其死者上唇裏弦有核子如黍米以針挑破之

復蘇

又方治如前

右以皂莢末或生半夏末少許吹兩鼻中

又法治如前

右凡中惡邪或魘死者不得用灯火照之亦不得近

前急喚或與接氣恐被注染多致殺人但只與痛咬  
脚跟及足把指甲邊多唾其面即活

又方治如前

右以好酒浸綿半盞及手授其汁灌鼻中

又法治如前

右以蘆管吹兩耳并取病人髮二七莖搥作任子刺

鼻中

又方治中惡鬼邪遊痛如刀刺或胸脇腹中絞痛急切

手不可近而按摩

右以好酒灌鼻孔亦治中惡吐血下血

又方治如前

右以鹽一錢水一盞攪和令勻服并以冷水噀之取  
吐即差

又方治如前

右以蓬茂酒研令服

又方治如前

右取壑下黃土水調服之

又方治中惡鬼邪為祟及鬼疰尸疰

右以桃仁研碎水煮頓服當吐即差不吐或吐不盡  
病再作或以桃仁汁煮米為粥與食

鱉頭散治尸疰瘦瘠時發寒熱

右以鱉頭一枚燒灰杵末新汲水調下半錢

雌黃丹治尸疰

雌黃

研水飛

雄黃

研水飛

川大黃

熯火煨  
黑色

鬼白

去毛各  
一兩

麝香

一分  
研

杏仁

三十箇湯浸  
去皮尖研

白頭翁

去蘆  
半兩

巴豆

十箇

去皮膜紙  
裹去油盡

右為細末拌勻以羊脂五兩鎔化和藥成膏丸黍米  
大每服三五粒荆芥湯下無時

立効散治尸疰

川大黃

一兩  
炮剉

乾菝柳葉

各一兩  
洗焙

梔子仁

半兩

赤芍藥

半兩

硃砂

一兩別  
研水飛

雄黃

一分別  
研水飛

麝香

一分  
別研

右為細末拌勻每服半錢蜜湯調下無時



神攻散治中蠱毒

大甘草

半兩  
生末

晉礬

一兩  
末

右拌勻新水調下一錢或半錢吐出毒物効

雄射散專治蠱毒

雄黃

一兩水  
飛研

射香

一兩  
研

羚羊角

一兩  
屑

鬼白

半兩  
去毛

赤芍藥

一兩  
兩

薺芫

去蘆  
半兩

敗鼓皮

一兩炙  
黃焦

馬兜鈴根

半兩

右除雄射外為細末入二味拌勻每服半錢濃煎甘

草湯調下無時

射屏湯治如前

犀角

一兩  
屑

鬼箭

取羽  
一兩

安息香

一兩

苦參

半兩

牡丹皮

去心

半兩已上  
先為末

雄黃

一兩  
水飛研

射香

半兩  
研

右拌勻細每服一錢水一盞煎至五分去滓放溫時服

甘草湯治中蠱毒欲死

右以甘草半兩剉碎用水一盞煎至五分去滓溫服  
當吐出毒物

寶靈丹治中蠱毒

硃砂

一兩研  
水飛

雄黃

一分研  
水飛

黃丹

一分  
研

苦藥子

一分

續隨子

一分去  
皮毛

山豆根

一兩  
生

蜈蚣

二條微炙  
一條生用

斑貓

一分去頭翅  
足半生半炒

巴豆

二分去膜  
出油盡

射香

二分  
研

右為細末拌研勻於端午日重九日合之最佳事急者不拘脩合時忌見鷄犬婦人用糯米粥和丸麻子大若未能語兒中毒即休如能語兒但將藥一粒入門即患兒先聞其香是驗以臘茶清送下壹丸不得

嚼破須臾患兒必言心頭作響聲毒物便下或從口  
鼻出或自大便下嫩即是血老即如諸虫狀其形不  
一藥隨物下凝血中裹之取出丸以香水洗淨收之  
一丸可救四五兒口噤者拗灌之如知用蠱之人即  
不得根究必再發不可治

治中蠱下血欲死

以藍搗汁頻頻服半合

治中蠱毒腹中堅痛面目青黃淋露骨立病變無常以

桃上寄生為末茶點服日四五

桔梗丸治鬼疰尸疰蠱疰皆療

桔梗

去蘆

藜蘆

去蘆

皂莢

去皮子

巴豆

去殼心膜

附子

各半豆許

右為末煉蜜和劑入臼杵萬下每服二丸或一丸如黍米大芥子大仰卧勿側眠至食時許病在膈上者即吐在膈下者即瀉取下惡物如蚪蚪蝦蟇胎或長一二尺下後大虛口乾但作鷄羹飲五合與極飲或食粥三四日乃痊病未除盡再服

夜啼論

小兒夜啼者症候甚多其所專者不出三種一者冷謂脾臟寒則腹痛而啼其候面青白手冷腹肚冷口中氣亦冷曲腰而啼不肯吮乳又有從生下多啼入夜則甚者此胃寒也亦曰胎寒聖濟經言積冷而夜啼夜則為陰冷則作痛故夜間痛甚令兒啼哭也二者熱謂心臟熱則煩噪而啼其候面赤小便赤口中氣熱心腹亦煖仰身而啼不肯吮乳又有多饒驚悸惕跳或睡中忽然

叫啼此風熱也亦曰驚啼心主熱其候驚故熱則生驚  
又心為火熱則火旺故熱邪燥甚令兒啼哭也三者邪  
祟謂有鬼氣所持其候睡卧不穩或作疼痛且鬼祟者  
陰物也入夜則旺小兒精神怯弱血氣嫩微夜間被鬼  
所持故令兒啼哭也外客忤蟲動重舌口瘡等病亦皆  
能為夜啼其治方各逐本項下具之非若此三等之  
為專也今叙方于後

蒜香膏治冷症腹痛夜啼

右以大蒜一顆慢火煨香熟取出切細研爛於日中  
暴或火上炕半乾可丸時即以好乳香秤半錢研細  
如粉入拌再研細勻丸如芥子大每服七丸乳頭粘  
服或乳汁送下食空

當歸丸治如前

當歸

去蘆洗淨  
焙乾秤

白芍藥

人參

去蘆各  
一分

甘草

炙

桔梗

去蘆

陳皮

不去白  
半分

右為細末每半錢水煎時時服之



龍角丸治小兒五驚夜啼

龍角

一分黃芩

半兩牡蠣

一分半火燉

作牡丹  
蚱蟬

去土  
二枚

牛黃

小豆大  
五塊

川大黃

一分  
半

右為末煉蜜和丸麻子大薄中兒二九大小以意加減  
芎藭散治小兒夜啼至明則安

芎藭

白朮

防己

各半  
兩

右為末以乳和與兒服以意量大小多少又母用手  
掩入兒臍中摩兒頭脊大驗兒生二十日以裏末

能服者以乳和麻子大一丸置兒口中乳汁送下

又方

交道中土

伏龍肝

各一把

右同研細水調少許飲之

治小兒夜啼

以蟬蛻去土為細末用生薑蜜水調塗兒下唇

又方治如前

男左女右臂上書尹喜二字更於手心內書天字一箇

又方治小兒驚啼夜啼

以臘月縛猪繩燒灰水調服

以蝟皮三寸燒灰著乳上飲之療如物刺啼

燈花丸治如前能祛邪止痛

以燈花二十箇乳香皂子大兩塊同為末粟米飲和  
丸芥子大每服七丸桃心湯下無時

萬金散治臟寒氣弱面色青白遇夜多啼狀若神祟

沉香剉丁香

人參去蘆

五味子去枝

梗炒

當歸

去蘆洗焙  
各一两

白朮

剉

赤芍藥

各半

桂心

一分

右為細末每用一錢淡漿水一小盞煎至五分放溫  
時時滴口中兒大稍稍飲立効

當歸散治胎寒氣啼不止久能變癩

右以當歸為末每用小豆許乳汁調抹兒口中日夜  
五服

三黃丸治熱症心燥夜啼及諸熱症

黃芩

半

大黃

去皮濕紙裏  
煨熟一分

黃連

去鬚  
一分

右為細末麵糊和丸菘豆大每服五七丸人參湯下  
亦治晝啼

又方治熱煩腹痛夜啼

右以真牛黃少許如小豆大乳汁化服又於臍下書  
一田字差

又方治熱症心躁夜啼

右以燈花三兩類用燈心湯調抹兒口中乳汁送下  
日三錢氏亦治臟冷夜啼但頓乳上令兒吮之又經驗

方以燈心燒灰塗乳上吃兒

紅朶散治風熱體如湯火夜啼不乳

天南星

二箇每箇中心剝作窩子入珠砂裝滿用木蓋蓋之水調取下中心末塗縫撮一地坑頓

在內以炭蓋之用火煨赤放冷取出研末

全蝎

半錢為末

白附子

大者二十箇為末

膩粉

一錢

右拌研勻每用一字金銀薄荷湯調下

綠霞散治如前

栢葉

二錢末

蝎末

一錢

天南星

炮過為末一分

白殭蠶

去絲嘴末一錢

鬱金

末一錢

雄黃

末一錢  
水飛

右拌勻細每服一字或半錢薄荷蜜水調下無時

前胡丸治風熱氣啼

右以去蘆前胡為末煉蜜和丸小豆大日服一九熟  
水下服至五六丸即差

牛黃膏治兒睡着時忽然乍驚哭而覺面赤口乾狀若  
神崇此雖夜啼非名夜啼也乃風熱邪氣乘心臟而  
作名曰驚啼

真牛黃

研

煨過牡蠣粉

硃砂

研水飛

雄黃

研飛各一分

人參

去蘆

甘草

炙各半兩

龍腦

半分研

右為末拌勻煉蜜和膏鷄頭子大每服半粒或一粒  
薄荷湯化下乳食後

安神丸治如前

麥門冬

去心焙

馬牙硝

白茯苓

乾山藥

甘草

半兩

寒水石

研各半兩

硃砂

一兩研水飛

龍腦

一字研

右為細末煉蜜和丸鷄頭子大每服半丸沙糖水化



下無時

虎睛散治驚惕夜啼

右以虎睛為散竹瀝調少許抹口中

又方治如前

右取車轄脂小豆許內口中又取內臍中

又方治如前

右以父亂頭髮燒灰研末酒調服一字更量大小溫

水亦得

又方治如前

右以鷄糞白燒灰研末米飲調服

明砂丸治心神不寧多驚心腹疼痛夜啼不止

硃砂

通明者  
二錢

杏仁

十四箇去  
皮尖炒黃

好坯子

半錢

右為末軟飯和丸黍米大每服三五丸薄荷湯下

麝香散治驚啼夜哭發歇不止

右以麝香研細用半字清水調下日二三服

鐵涎膏治諸驚夜啼

丁頭代赭石

半兩火煨醋汗不記  
適數以易碎為度

鐵鋪粉

一錢

白附子

一錢

辰砂

一錢  
水飛

麝香

一字  
研

龍腦

一字  
研

右為細末拌勻蒸棗爛和成膏旋用嬰孩半皂子許

至二三歲一皂子許金銀薄荷湯化下不拘時候

七寶輕青丹治驚啼夜哭及諸熱等疾

螺青

半兩

蛤粉

一分

鈎藤

炒為末  
一錢

白附子

三字

鉛錫灰

二錢

丁香

一字  
炒

天竺黃

一錢

右為細末入麝香半皂子許研細拌勻米粉煮糊和

九菟豆大每服一九薄荷湯磨水下無時

又方治夜間卒驚啼哭似有痛處而不知疾狀

右取雄鷄冠血臨兒口上滴少許入口中即差

又方治如前

右以亂髮燒灰為末塗乳上令兒吮之能食者飲調亦得

甌帶法治鬼祟邪厲夜啼

右取甌帶懸戶上

又法治如前

右以胡粉水調二大豆許與服日三

馬骨末治小兒諸夜啼

右以馬骨為細末傅母乳頭上令小兒吮服即止

又方治如前

右取狼糞中骨燒灰研為細末服黍米許便止

又方治如前

右取鷄窩中草安於卧席之下勿令乳母知之

諸汗論

小兒有遍身喜汗出者此榮衛虛也榮衛相隨通行經絡營周於身環流不息榮陰衛陽榮虛則津液泄越衛虛則不能固密故喜汗出遍身也錢乙用香瓜丸若睡中汗出不自知覺者此肌肉虛而盜汗也如盜者竊物使人不知覺也又有但額上汗出者此厚衣溫暖將養過宜也上二項錢乙並用止汗散若上至頭下至項有汗而不曾過背者此六陽虛汗也六陽脉皆上至於頭

故也若上至項下至臍有汗者此胃虛汗也當與補胃  
昔錢乙治張氏三子大者喜遍身汗出次者汗上至項  
下至臍小者但額面有汗至項下而無他醫以麥煎散  
治之不効遂請乙治之大者與香瓜丸次者與益黃散  
小者與石膏湯各五日而愈錢乙治方本集載之外收  
諸方叙之後

沉香黃耆散治榮衛虛遍身喜汗

沉香

剉

綿黃耆

剉

人參

去蘆

當歸

去蘆

淨焙

洗

赤芍藥

已

各一  
木香 桂心 各半  
兩

右為細末每服一大錢水一小淨盞入生薑三片棗  
一枚同煎至半盞去滓放溫食前時時與服

菴蓉丸治血少喜泔

肉菴蓉

一兩酒浸一宿  
刮去外皮炙乾

鱉甲

一兩酥炙  
黃去裙襖

綿黃耆

半兩

何首烏

半兩

右為細末煉蜜和九黍米大每服十九米飲送下食

前



木槿花治盜淖

右取木槿花開而再合者焙乾為末每用一錢猪皮煎湯調下食後臨卧

牡蠣散治盜淖

牡蠣

一兩  
煨赤

麻黃根

二兩  
剉

甘草

半兩

右為末每用二錢以野水一盞煎至七分去滓放温無時

升麻湯治肌熱盜淖

升麻

綿黃耆

去蘆

人參

去蘆各

一兩

熟乾地黄

天竺黃

研

狂蠣粉

研各

半兩

右為細末拌勻每服半錢或一錢煎竹葉湯調下無

時

柴胡人參散治如前

柴胡

去蘆

人參

去蘆

白朮

白茯苓

青皮

去穰

桔梗

去蘆

麥門冬

去心

川芎

白芍藥

甘草

炙

桑白皮

升麻

右等分為末每服一錢水一盞煎至七分溫服無時

紫蘇飲治肌熱煩躁多渴盜汗揉鼻腹滿

柴胡

去苗

藿香

去土

甘草

烏梅肉

紫蘇葉

去土

乾葛

人參

去蘆

茯苓

麥門冬

去心

秦朮

去蘆

地骨皮

去骨

防風

去蘆并

義枝

右等分為末每二錢水一盞煎至七分去滓放溫時

時呷

沉香鱉甲丸治潮熱盜汗

沉香

剉

草龍膽

去蘆

鱉甲

童子小便浸一宿塗酥

炙焦去裙襴各一兩

綿黃耆

一两  
剉

川黃連

去鬚  
半两

川大黃

半两  
微炮

右為細末煉蜜和丸黍米大每服十九用麥門冬去

心煎湯送下無時

柴胡黃連膏治盜汗潮熱往來

柴胡

去苗

黃連

等分

右為末煉蜜和膏丸鷄頭子大每一二九銀器中用

酒少許化開入水五分重湯煮二三十沸放溫服無時

黃耆散治虛熱盜汗

牡蠣粉

黃耆

生乾地黃

焙乾  
等分

右為細末每服一錢水一小盞煎至六分去滓溫服

無時

虎杖散治實熱盜汗

右以虎杖剉細水煎服之量大小多少與服

黃連粉治盜汗

黃連

去  
鬚

牡蠣粉

貝母

去心各等  
分為細末

右如三味各一兩即入米粉一兩研勻細以粉身

龍膽粉治如前千金治頭淅

牡蠣粉

茯苓

各二兩

右同為細末於生絹袋子盛之有淅即撲身

牡蠣粉治諸淅

牡蠣粉

二兩

麻黃根

赤石脂

糯米粉

各一兩

右勻為細末入龍腦末一錢拌之每用一時頭新綿包撲有淅之處止盜淅最佳

又方名同治同

牡蠣粉

二兩

麻黃根

二兩

蛇床子

乾薑

各半兩

右同為細末用如上法

治小兒臟熱多滯犀角飲子

犀角屑

三分

茯神

去心內木

龍齒

各一兩

麥門冬

去心一兩半

甘草

半兩

白朮

一分

右為末每服一錢水一盞煎至七分去滓溫服無時

不語論

小兒有不能語者其證有三一者心氣不足心繫舌本

氣營而舉之則舌本動而語聲作矣今氣怯而不能營用於舌故不能語也此證已在五氣項下具之二者卒不能語因風寒之邪干於啞門連絡舌本使舌本緊急故卒不能語也又一證喉嚨為氣之道路會厭為聲之門戶暴為風容於喉厭則失音而語聲不出非不能語也三者因病後不能語此因服清藥以利小便致腎虛而不能上接於陽故不能語昔錢乙治王氏慢驚病愈後有聲而不能語衆以為失音乙曰既失音何開目而



能飲食又牙不噤口不緊而能嚥藥衆醫皆不曉乙曰  
此因用清藥利小便致虛腎氣不能上接於陽故也遂  
用地黃元補腎而漸漸能言一月而愈其方本集載之  
外收方具後

菖蒲散治感風寒干於啞門卒不能語

菖蒲 桂心 遠志

去心甘草水  
煮各一分

右為細末每一錢水一鍾煎至五分溫服無時

桂散治風寒容於喉厭語聲不出

川芎

三分遠志

去心甘草  
水煮三分

麥門冬

去心  
三分

人參

去蘆  
半兩

右為細末煉蜜和丸小豆大平旦空心米飲下五九

日三兒大加之久服取効

### 渴論

小兒有渴而飲水者此因臟腑有熱熱則臟燥故多體熱發煩亡耗津液即令作渴欲飲水以解之也又有疳渴吐瀉發渴霍亂發渴者各逐本項具之閔孝忠云凡小兒諸渴因亡失津液引飲者但多煎錢氏白朮散與

服使任意取足飲之彌多彌好其方本集所載熱渴者  
叙方于後

蓮湯散治嬰小發渴心燥

右以粉霜研極細每嬰孩一字三四歲下者半錢煎  
蓮花湯調下冬月無花時蓮肉代之

香葛湯治渴甚津液燥

木香

乾葛根

剉人參

去蘆各一兩

白茯苓

藿香葉

去土

甘草

炙各半兩

右為細末次用麝香半錢研細入藥拌勻每服半錢  
或是一錢生薑湯調溫服無時

葛根湯治體熱煩渴

葛根

人參

去蘆各  
一兩

麥門冬

去  
心

白茯苓

澤瀉

甘草

炙各  
半兩

右為細末每服一錢水八分入生薑二片薄荷三葉  
煎六分去滓溫量大小服無時

涼肌丸治肌熱臉赤煩渴燥悶

龍膽草

去蘆  
二兩

玄參

去蘆  
一兩

當歸

去蘆洗  
淨一兩

右為細末煉蜜和丸菘豆大每服一二十九竹葉湯

下無時

葛根飲子治熱渴久不止

右以葛根半兩剉碎水一盞煎至六分去滓頻頻服

無時

神螞散治一切諸渴

右以大牡蠣於臘日端午日用黃泥裹煨通赤放冷

去泥為細末取活鯽魚煎湯調下半錢只一二服差  
治小兒熱渴久不止

右以石蓮心三十箇炒黃浮萍一分水一鍾生薑少  
許同煎至六分去滓每服半合徐徐服

### 血溢論

小兒諸血溢者由熱乘於血氣也血得熱則流溢隨氣  
而上從鼻出者為軌衄從口出者多則為吐血少則為  
唾血若流溢滲入大腸而下者則為便血滲入小腸而

下者為溺血又有血從耳目牙縫斷舌諸竅等出者是  
血隨經絡虛處著溢自皮孔中出也今叙方于後

盆硝

一分  
研

亂髮

一分  
燒  
研

紅藍花

一分  
為末

右同勻細以綿纏之搵藥塞鼻孔中

槐花散治如前

槐花

一兩  
炒

蒲黃

半兩

川麩薑

一分

右為細末每服半錢新水調下無時

又方治如前

右以滑石為細末飯九蘿蔔子大每服二三十丸微  
微嚼碎新水嚥下未能嚼者搥碎與之

又方治如前

右以生蘿蔔剉碎研取汁入酒相當量大小溫服立  
止

華蓋散治唾血吐血

阿膠

半兩蛤粉炒如  
珠子去蛤粉

黃芩

一分  
去蘆  
一分

人參

右為細末每服半錢陳米飯調下無時



紫參散治如前

紫參

山梔子仁

生乾地黄

各一兩

刺芥

燒灰

亂髮

燒灰

蒲黃

研

伏龍肝

研

各一分

右拌細勻每服半錢或一錢煎竹茹湯調下無時

黃連散治吐血

右以黃連一兩去鬚為細末每服一錢水七分入豉二十粒同煎至五分去滓溫服無時

又方治如前

右取蒲黃細研每服半錢用生地黄汁調下無時

又方治如前

右以蛇蛻皮炒焦黃為末乳汁調下

又方治如前

右以黃明膠新綿各一两並燒灰研為細末每服半錢或一錢糯米飲下日三

又方治如前

右以燈心淨碗內燒灰以物蓋之研為末每服半錢

或一錢麝香湯調下

甌帶灰治大便下血

右以甌帶燒灰研末塗乳下與兒吮之南人以蒲為  
甌帶久經蒸溜或敗爛者良

又方治如前

右以車釭燒赤內水中飲服

又方治如前

右取鷓鴣翅下血與服或以鼈頭一枚灸黃焦為末

飲調半錢服

車前散治小兒尿血

車前子

一分

牡蠣

半兩煨為粉

甘草

一分炙

川朴硝

一分

右為細散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服

又方治如前

右以甘草二兩炙黃為細末煉蜜和圓菘豆大每服  
五七丸溫水下日二或生剉以水六合煎取二合去  
滓服

神白散治諸吐衄便溺等血妄出

槐花

半兩  
微炒

蛤粉

一兩

右為細末每服半錢或一錢煎柳枝湯調下

青龍丹治小兒熱盛一切血妄行神効

甘草

貫衆

茯苓

乾葛

龍腦

薄荷葉

藿香

各一兩

縮砂

五兩  
去皮

山茵陳葉

寒水石

各六兩

右為細末麪糊和丸櫻桃大別研青黛為衣

又方治諸血妄行從耳目口中鼻中出

右以赤馬糞燒灰研為細末溫酒調下一字或半錢  
看大小與服

地黃散治舌上出血如針孔

生乾地黃

一兩

明膠

半兩炒

右為末溫湯調下一二錢

又方治如前

右以豉一合水一盞煎數沸溫服半盞或一盞亦治  
下血

又方治如前

右以小豆一合為末水三盞和攪汁飲之

戎鹽丸治舌上有數黑孔血出如湧泉

戎鹽

黃芩

黃蘗

大黃

各二兩半

人參

桂心

各一兩

甘草

半兩炙

右為細末煉蜜和丸菴豆大飲下五七圓日三如舌

上孔穴大血不止者仍燒鐵烙之

苦竹葉汁治牙齒斷縫間血不止

右以苦竹葉不拘多少水煎濃汁入鹽少許通口漱盪  
又方治如前

右以童子小便半盞煖熱通口漱盪

喫法治九竅四肢指岐間皆出血此暴驚所致

右勿令患人知覺以井花水猛喫其面


治小兒尿血

以鵲巢燒灰井花水調服

以川升麻五分水五合煎取一合去滓一歲兒日服



畫



小兒衛生總微論方卷十五